

ké pasty (J Dent Res, 1979 58(2): p. 588-592), relatívni hodnota RDA v porovnaní s výrobkom „C“ = RDA 27, výsledky měření:Výrobek „C“ = 255 / Two in One = 260

SK Návod na použitie

LUNOS Leštiaca pasta Two in One

Neutrálra / Pamarančová / Máťová

Leštiaca pasta LUNOS Two in One je k dispozícii v nasledujúcich omnoch:

Neutrálra (REF: CP7270A1901)

Pamarančová (REF: CP7270A1901)

Máťová (REF: CP7270A1901)

Po výberu
Políru Leštiaca pasta Two in One je dentálna leštiaca pasta. Je určená na čistenie supragingiválnych zubných povrchov komerčne dostupných dentálnych leštiacích nástrojov. Používať výlučne špecializovaní zubní odborníci! Postupujte podľa pokynov na používanie leštiaceho nástroja. Zčistenie leštiacou pastou LUNOS Two in One neobsluhuje žiadne osobné alebo lekárske životné potreby, gluten, laktozu, fruktózu a mikroplasty.

Indikácia

- Tento výrobok sa odporúča na šetrné odstránenie mäkkých plakových povlakov, ktoré sú súčasťou leštenia supragingiválnych zubných povrchov v jednom pracovnom kroku.

- Čistenie zubných povrchov pred:
 - aplikáciou ortodontických zrámkov
 - aplikáciou fluoridových a bielacích prípravkov

LUNOS leštiaca pasta Two in One je dentálna leštiaca pasta „samoredukujúca“. To znamená, že špeciálne sa počas leštenia leštiace partikuly tvoria tým, než sa odstraňujú, a rozpadajú. Tak sa môže v jednom pracovnom kroku počas prvých 10 sekúnd čistenia rýchlo a dokladne odstrániť pokračovať bez potrebného nato vykonať šetrné leštenie resp. políru supragingiválnych zubných povrchov.

LUNOS leštiaca pasta Two in One vykazuje RDA o veľkosti < 28* a je vhodná pre deti a dospelých.

Kontraindikácie
Neaplikujte pri chýbajúcej ochranné reflexy. Ak sú závažné alergie proti pamarančovej aróme (límonnej) alebo edú v mišy pelyornej (mentol), odporúčame variant „neutrálra“. LUNOS leštiaca pasta Two in One, podľa priloženej diagnostiky ktorá na fluoriscenčnom zázname nesmie byť použitá omno „Máťová“, ale alternatívnu dentálnu „Neutrálra“ alebo „Pamarančová“.

Upozornenie

Neprehliadajte. Zabráňte kontaktu s očami. V prípade kontaktu s očami sa musia oči vypláchnuť jupným mýdlovým voľm. Všetky závažné príznaky svedčia o týmto výnimočom a musia bezodkladne oznámiť výrobcovi a lekárenskému orgánu jeho určeného štátu. Pripravok je určený k použitiu u človeka.

Bezpečnostné opatrenia

Keďže si predchádza vplyv pôsobu pasty na pokožku. Pri práci s LUNOS leštiacou pastou Two in One noste výborný ochranný odev. Pacient si môže lekárska musia vhodnú ochranu od/ochranu vrátiť. Ošetroujú lekár musí vhodný ochranný výstroj vo forme rúba na nos a usta a vhodné ochranné rukavice.

Pri ochrane citlivých pred čistením na pacientovej prave vyznači:
• Po ukončení ošetroenia oznámiť pacienta jednorázovo výšku úterku, napr. wellnessovou úterku zbrak LUNOS Propy. Povrchy dentálnej jednotky po použití očistiť po kontakte s leštiacou pastou vo vhodnú úterku.

Dojde, prosím, na to, aby ste zabránili výskyt tvorby na zube, pretože vždy musí byť postužujúce množstvo leštiacej pasty medzi leštiacim nástrojom a zubom. Z toho dôvodu dajte tiež na to, aby ste neprekročili výrobnú odporúčanú maximálnu početnosť použitia leštiaceho nástroja. Dodržujte výrobný návod na použitie leštiaceho nástroja.

Príprava pasty

Pred odberom leštiacej pasty odstráňte originálnu pečať pod skrutkovacím uzáverom. Veko znovu naskrutkujte. Dobrotu postužujúce množstvo leštiacej pasty a naplňte do aplikátora. Následne aplikujte, napr. do krúžku LUNOS Propy. Dávaním následne alebo podobnej vhodnej leštiacej pasty. Pomocou vhodného leštiaceho nástroja naberte leštiacu pastu a začinite leštiť pacienta. Pamätajte, prosím, na to, že samoredukujúca leštiaca pasta nastupí po cca 10 sekundách. Leštie tak úto, kým sa leštiaca časťce neobjaví. Aby sa po odstránení leštiacej pasty dostali všetky leštiace častice.

Kľúčovane a maximálna trvanlivosť

Po odobratí pasty túba ihneď opustiť zdravotní zariadenie, čím zabránite výskytu pasty. Skladujte v uzavretých, sterilných zabíjaniach, vyhýbajte sa vlhkosti a priamemu slnečnému žiareniu. Skladujte pri teplote od 0 °C do 25 °C. Nepodporuje výrobu kyselín, toxických látok, kyselých, ktoré je na ňom uvedený. Po otvorení je trvanlivosť 12 mesiacov.

Likvidácia odpadu

Likvidujte podľa miestnych urýchlených predpisov.

Zistenie

Two in One neutrálra: silikát, glicerin, destilovaná voda, hydroxyapatit, regulátor kyselosti, konzervačné prostriedky (2-fenoxyetanol, ethylglyglycerin), zahusťovač, emulgátor, farbivo (C.I. 42090, C.I. 47005), pamarančová aróma (obsahuje límonen).

Two in One máťová: silikát, glicerin, destilovaná voda, hydroxyapatit, regulátor kyselosti, konzervačné prostriedky (2-fenoxyetanol, ethylglyglycerin), zahusťovač, emulgátor, farbivo (C.I. 42090, C.I. 47005), máťový olej (obsahuje límonen).

Metoda podľa Stokley/Schemmora s referenčnou hodnotu pemza pre profilaktické pasty (J Dent Res, 1979 58(2): p. 588-592) relatívna hodnota RDA v porovnaní s výrobkom „C“ = RDA 27 výsledky merania: výrobok „C“ = 255 / Two in One = 260

SL. Navodila za uporabo

Polirna pasta LUNOS Two in One

Neutrálra / pamarančová / meta

Polirna pasta LUNOS Two in One je na voljo v naslednjih različicah:

Neutrálra (REF: CP7270A1901)

Pamarančová (REF: CP7270A1901)

Máťová (REF: CP7270A1901)

Opis izdelka
Polirna pasta LUNOS Two in One je dentálna polirna pasta. Predvidena je za čiščenje supragingiválnih zobnih površín s uporabo komerčno dostupnih dentálnih polirnih instrumentov. Samo za uporabo s strani zobozdravnikov! Upoštevajte navodila za uporabo, gluten, laktozo, fruktózo in mikroplaste.

Indikácia

- Izdelek se priporoča za šetrné odstranjevanie obarvanja in oblog ter nato poliranje supragingiválnych zubných povrchov, v enem kroku.
- Čistenie zubných povrchov pred:
 - nanášaním ortodontických opravic,
 - aplikáciou fluoridných prípravkov in preparátov za bieleňie,
 - otváraním kompozitných restaurácií in protetičným nadmeskom, napr. inleju, onleju, koroniek.

Polirna pasta LUNOS Two in One je dentálna polirná pasta. Predvidena je za čiščenje supragingiválnych zubných površín. Tak je možno v enom delovnom kroku fara čistenia, nanášaním kompozitných restaurácií a protetičným nadmeskom. Upoštevať navodila za použitie pasty po prvých 10 sekundách ihneď v temlejší odstránení oblog, takoj začať na nežno aplikovať supragingiválnu zobnú površinu.

Polirna pasta LUNOS Two in One ima RDA < 28* in je primer na deti a odrasle, je málo razvít profilaktický reflex.

Kontraindikácie

Neuporabujte v prímerni používaní nadzora požiadavne reflexov. V prímerni znane alergie na arómu pamaranče (límonnej) ali oči poprove mety (mentol), priporočamo

uporabo neutrálne različice polirne paste LUNOS Two in One. Pred upotrebovanjem kariera na osnovi fluorescenčne se ne sme uporabiti različice z arómo mety, temveč je treba uporabiti alternativno neutrálno različico ali različico z arómo pamaranče.

Neuporabite

Ne popolnite. Vozite se s stiku z očmi. V prímerni stiku z očmi izpolnje z obilico vode. V oči resniš zapletli, do katerih pride v povezavi s tem izdelkom, je treba uporabiti zdravilno sredstvo v pristojnem organu v vaši državi članici. Pripravi je predviden za uporabo pri ljudeh.

Previdnostni ukrepi
Pozorno preberite vse navodila in jih upoštevajte. Pri delu z LUNOS polirno pasto Two in One morate biti previdni pri delu s pastjo. Če se pastja ne odstrani, natoš varovano oprejo. V volitbi zaščiti izli v nosu ter zaščite nočnice.

Za zaščito občutljivih delov kože pred uporabo na bolnikove ustnice naneste vazelin. Po končanem postopku z vlažno brisačo za enkratno uporabo, napr. serotičnato krpljo za udobje LUNOS, obrišite bolnikova usta. Površine zobne emole po uporabi polirne paste očistite z vlažno kúo.

Pazite, da preprečite uživanje toplote na zebu, in sicer mora biti med polirnim instrumentom in zobom vedno dovolj polirne paste. Zato pazite tudi, da ne prešetite maksimalnega dovoljenega števila vtisov, ki ga navaja proizvajalec polirnega instrumenta. Upoštevajte navodila za uporabo, ki jih zagotovi proizvajalec instrumenta.

Prigra za delo
Pred čiščenjem polirne paste iz tuba odstranite pečat za zagotavljanje originalnosti izpod pokrovčka. Pokrovček prilepi nazaj. Zadošče količino polirne paste izčistite v aplikacijski prstan, npr. prstan za profilsko LUNOS Propy-Ring, stekleno čašo z debelo steno ali podobno primerni vazo. Polirno pasto zmešajte z ustreznim polirnim instrumentom in začnite postopek poliranja. Upoštevajte, da samoredukcijska pasta nastopi po pribli 10 sekundah. Polirajte tako dolgo, da se polni delci zmanjšajo in da po odstranitvi odloži pride do celotni poliranja.

Po iztisu paste iz tuba, lahko ponovno dobro zapirte pokrovček, da preprečite izsušitev paste. Shranišite v zaprti, dobro prezračevalni prostoru, zaščiten pred vlago in neposredno sončno svetlobo na temperaturi med 0 °C in 25 °C. Po izteku navedene roke uporabe izdelka ne uporabljajte. Po odprtju je rok uporabe 12 mesecev.

Odstranjevanje
Med odpadke zavrzite vsa ostala v lokalni regulirani odpadki.

Sevasta
Two in One – neutrálra: silikát, glicerin, destilirana voda, hidroksiapatit, sredstvo za zgoščevanje, konzervansi (2-fenoksietanol, etilglicerin), sredstvo za zgoščevanje, emulgator.

Two in One – pamaranča: silikát, glicerin, destilirana voda, hidroksiapatit, sredstvo za uravnavanje kiselosti, konzervansi (2-fenoksietanol, etilglicerin), sredstvo za zgoščevanje, emulgator, barvila (C.I. 42900, C.I. 47005), ale pamarančeva aróma (obsahuje límonen).

Two in One – meta: silikát, glicerin, destilirana voda, hidroksiapatit, sredstvo za uravnavanje kiselosti, konzervansi (2-fenoksietanol, etilglicerin), sredstvo za zgoščevanje, emulgator, barvila (C.I. 42900, C.I. 47005), ale poprove mety (esbuje límonen).

Metoda po Stokley/Schemmora s plovcem kot referenčno snovjo za profilaktične pasty (J Dent Res, 1979 58(2): p. 588-592) relatívna RDA-Vert im Vergleich zu Produkt „C“ = RDA 27 Messergebnisse: Produkt „C“ = 255 / Two in One = 260

Príprava pasty
Pred odberom leštiacej pasty odstráňte originálnu pečať ispod skrutkovacím uzáverom. Veko znovu naskrutkujte. Dobrotu postužujúce množstvo leštiacej pasty a naplňte do aplikátora. Následne aplikujte, napr. do krúžku LUNOS Propy. Dávaním následne alebo podobnej vhodnej leštiacej pasty. Pomocou vhodného leštiaceho nástroja naberte leštiacu pastu a začinite leštie pacienta. Pamätajte, prosím, na to, že samoredukujúca leštiaca pasta nastupí po cca 10 sekundách. Leštie tak úto, kým sa leštiaca časťce neobjaví. Aby sa po odstránení leštiacej pasty dostali všetky leštiace častice.

Kľúčovane a maximálna trvanlivosť
Po odobratí pasty túba ihneď opustiť zdravotní zariadenie, čím zabránite výskytu pasty. Skladujte v uzavretých, sterilných zabíjaniach, vyhýbajte sa vlhkosti a priamemu slnečnému žiareniu. Skladujte pri teplote od 0 °C do 25 °C. Nepodporuje výrobu kyselín, toxických látok, kyselých, ktoré je na ňom uvedený. Po otvorení je trvanlivosť 12 mesiacov.

Likvidácia odpadu

Likvidujte podľa miestnych urýchlených predpisov.

Zistenie

Two in One neutrálra: silikát, glicerin, destilirana voda, hidroksiapatit, sredstvo za uravnavanie kiselosti, konzervansi (2-fenoksietanol, etilglicerin), sredstvo za zgoščevanje, emulgator, barvila (C.I. 42900, C.I. 47005), ale poprove mety (esbuje límonen).

Two in One – meta: silikát, glicerin, destilirana voda, hidroksiapatit, sredstvo za uravnavanie kiselosti, konzervansi (2-fenoksietanol, etilglicerin), sredstvo za zgoščevanje, emulgator, barvila (C.I. 42900, C.I. 47005), ale poprove mety (esbuje límonen).

Metoda po Stokley/Schemmora s plovcem kot referenčno snovjo za profilaktične pasty (J Dent Res, 1979 58(2): p. 588-592) relatívna RDA-Vert im Vergleich zu Produkt „C“ = RDA 27 Messergebnisse: Produkt „C“ = 255 / Two in One = 260

Príprava pasty
Pred odberom leštiacej pasty odstráňte originálnu pečať pod skrutkovacím uzáverom. Veko znovu naskrutkujte. Dobrotu postužujúce množstvo leštiacej pasty a naplňte do aplikátora. Následne aplikujte, napr. do krúžku LUNOS Propy. Dávaním následne alebo podobnej vhodnej leštiacej pasty. Pomocou vhodného leštiaceho nástroja naberte leštiacu pastu a začinite leštie pacienta. Pamätajte, prosím, na to, že samoredukujúca leštiaca pasta nastupí po cca 10 sekundách. Leštie tak úto, kým sa leštiaca časťce neobjaví. Aby sa po odstránení leštiacej pasty dostali všetky leštiace častice.

Kľúčovane a maximálna trvanlivosť
Po odobratí pasty túba ihneď opustiť zdravotní zariadenie, čím zabránite výskytu pasty. Skladujte v uzavretých, sterilných zabíjaniach, vyhýbajte sa vlhkosti a priamemu slnečnému žiareniu. Skladujte pri teplote od 0 °C do 25 °C. Nepodporuje výrobu kyselín, toxických látok, kyselých, ktoré je na ňom uvedený. Po otvorení je trvanlivosť 12 mesiacov.

Príprava pasty
Pred odberom leštiacej pasty odstráňte originálnu pečať pod skrutkovacím uzáverom. Veko znovu naskrutkujte. Dobrotu postužujúce množstvo leštiacej pasty a naplňte do aplikátora. Následne aplikujte, napr. do krúžku LUNOS Propy. Dávaním následne alebo podobnej vhodnej leštiacej pasty. Pomocou vhodného leštiaceho nástroja naberte leštiacu pastu a začinite leštie pacienta. Pamätajte, prosím, na to, že samoredukujúca leštiaca pasta nastupí po cca 10 sekundách. Leštie tak úto, kým sa leštiaca časťce neobjaví. Aby sa po odstránení leštiacej pasty dostali všetky leštiace častice.

Kľúčovane a maximálna trvanlivosť
Po odobratí pasty túba ihneď opustiť zdravotní zariadenie, čím zabránite výskytu pasty. Skladujte v uzavretých, sterilných zabíjaniach, vyhýbajte sa vlhkosti a priamemu slnečnému žiareniu. Skladujte pri teplote od 0 °C do 25 °C. Nepodporuje výrobu kyselín, toxických látok, kyselých, ktoré je na ňom uvedený. Po otvorení je trvanlivosť 12 mesiacov.

Príprava pasty
Pred odberom leštiacej pasty odstráňte originálnu pečať pod skrutkovacím uzáverom. Veko znovu naskrutkujte. Dobrotu postužujúce množstvo leštiacej pasty a naplňte do aplikátora. Následne aplikujte, napr. do krúžku LUNOS Propy. Dávaním následne alebo podobnej vhodnej leštiacej pasty. Pomocou vhodného leštiaceho nástroja naberte leštiacu pastu a začinite leštie pacienta. Pamätajte, prosím, na to, že samoredukujúca leštiaca pasta nastupí po cca 10 sekundách. Leštie tak úto, kým sa leštiaca časťce neobjaví. Aby sa po odstránení leštiacej pasty dostali všetky leštiace častice.

Kľúčovane a maximálna trvanlivosť
Po odobratí pasty túba ihneď opustiť zdravotní zariadenie, čím zabránite výskytu pasty. Skladujte v uzavretých, sterilných zabíjaniach, vyhýbajte sa vlhkosti a priamemu slnečnému žiareniu. Skladujte pri teplote od 0 °C do 25 °C. Nepodporuje výrobu kyselín, toxických látok, kyselých, ktoré je na ňom uvedený. Po otvorení je trvanlivosť 12 mesiacov.

Príprava pasty
Pred odberom leštiacej pasty odstráňte originálnu pečať pod skrutkovacím uzáverom. Veko znovu naskrutkujte. Dobrotu postužujúce množstvo leštiacej pasty a naplňte do aplikátora. Následne aplikujte, napr. do krúžku LUNOS Propy. Dávaním následne alebo podobnej vhodnej leštiacej pasty. Pomocou vhodného leštiaceho nástroja naberte leštiacu pastu a začinite leštie pacienta. Pamätajte, prosím, na to, že samoredukujúca leštiaca pasta nastupí po cca 10 sekundách. Leštie tak úto, kým sa leštiaca časťce neobjaví. Aby sa po odstránení leštiacej pasty dostali všetky leštiace častice.

Kľúčovane a maximálna trvanlivosť
Po odobratí pasty túba ihneď opustiť zdravotní zariadenie, čím zabránite výskytu pasty. Skladujte v uzavretých, sterilných zabíjaniach, vyhýbajte sa vlhkosti a priamemu slnečnému žiareniu. Skladujte pri teplote od 0 °C do 25 °C. Nepodporuje výrobu kyselín, toxických látok, kyselých, ktoré je na ňom uvedený. Po otvorení je trvanlivosť 12 mesiacov.

Príprava pasty
Pred odberom leštiacej pasty odstráňte originálnu pečať pod skrutkovacím uzáverom. Veko znovu naskrutkujte. Dobrotu postužujúce množstvo leštiacej pasty a naplňte do aplikátora. Následne aplikujte, napr. do krúžku LUNOS Propy. Dávaním následne alebo podobnej vhodnej leštiacej pasty. Pomocou vhodného leštiaceho nástroja naberte leštiacu pastu a začinite leštie pacienta. Pamätajte, prosím, na to, že samoredukujúca leštiaca pasta nastupí po cca 10 sekundách. Leštie tak úto, kým sa leštiaca časťce neobjaví. Aby sa po odstránení leštiacej pasty dostali všetky leštiace častice.

Kľúčovane a maximálna trvanlivosť
Po odobratí pasty túba ihneď opustiť zdravotní zariadenie, čím zabránite výskytu pasty. Skladujte v uzavretých, sterilných zabíjaniach, vyhýbajte sa vlhkosti a priamemu slnečnému žiareniu. Skladujte pri teplote od 0 °C do 25 °C. Nepodporuje výrobu kyselín, toxických látok, kyselých, ktoré je na ňom uvedený. Po otvorení je trvanlivosť 12 mesiacov.

Príprava pasty
Pred odberom leštiacej pasty odstráňte originálnu pečať pod skrutkovacím uzáverom. Veko znovu naskrutkujte. Dobrotu postužujúce množstvo leštiacej pasty a naplňte do aplikátora. Následne aplikujte, napr. do krúžku LUNOS Propy. Dávaním následne alebo podobnej vhodnej leštiacej pasty. Pomocou vhodného leštiaceho nástroja naberte leštiacu pastu a začinite leštie pacienta. Pamätajte, prosím, na to, že samoredukujúca leštiaca pasta nastupí po cca 10 sekundách. Leštie tak úto, kým sa leštiaca časťce neobjaví. Aby sa po odstránení leštiacej pasty dostali všetky leštiace častice.

Kľúčovane a maximálna trvanlivosť
Po odobratí pasty túba ihneď opustiť zdravotní zariadenie, čím zabránite výskytu pasty. Skladujte v uzavretých, sterilných zabíjaniach, vyhýbajte sa vlhkosti a priamemu slnečnému žiareniu. Skladujte pri teplote od 0 °C do 25 °C. Nepodporuje výrobu kyselín, toxických látok, kyselých, ktoré je na ňom uvedený. Po otvorení je trvanlivosť 12 mesiacov.

Príprava pasty
Pred odberom leštiacej pasty odstráňte originálnu pečať pod skrutkovacím uzáverom. Veko znovu naskrutkujte. Dobrotu postužujúce množstvo leštiacej pasty a naplňte do aplikátora. Následne aplikujte, napr. do krúžku LUNOS Propy. Dávaním následne alebo podobnej vhodnej leštiacej pasty. Pomocou vhodného leštiaceho nástroja naberte leštiacu pastu a začinite leštie pacienta. Pamätajte, prosím, na to, že samoredukujúca leštiaca pasta nastupí po cca 10 sekundách. Leštie tak úto, kým sa leštiaca časťce neobjaví. Aby sa po odstránení leštiacej pasty dostali všetky leštiace častice.

Kľúčovane a maximálna trvanlivosť
Po odobratí pasty túba ihneď opustiť zdravotní zariadenie, čím zabránite výskytu pasty. Skladujte v uzavretých, sterilných zabíjaniach, vyhýbajte sa vlhkosti a priamemu slnečnému žiareniu. Skladujte pri teplote od 0 °C do 25 °C. Nepodporuje výrobu kyselín, toxických látok, kyselých, ktoré je na ňom uvedený. Po otvorení je trvanlivosť 12 mesiacov.

Príprava pasty
Pred odberom leštiacej pasty odstráňte originálnu pečať pod skrutkovacím uzáverom. Veko znovu naskrutkujte. Dobrotu postužujúce množstvo leštiacej pasty a naplňte do aplikátora. Následne aplikujte, napr. do krúžku LUNOS Propy. Dávaním následne alebo podobnej vhodnej leštiacej pasty. Pomocou vhodného leštiaceho nástroja naberte leštiacu pastu a začinite leštie pacienta. Pamätajte, prosím, na to, že samoredukujúca leštiaca pasta nastupí po cca 10 sekundách. Leštie tak úto, kým sa leštiaca časťce neobjaví. Aby sa po odstránení leštiacej pasty dostali všetky leštiace častice.

Kľúčovane a maximálna trvanlivosť
Po odobratí pasty túba ihneď opustiť zdravotní zariadenie, čím zabránite výskytu pasty. Skladujte v uzavretých, sterilných zabíjaniach, vyhýbajte sa vlhkosti a priamemu slnečnému žiareniu. Skladujte pri teplote od 0 °C do 25 °C. Nepodporuje výrobu kyselín, toxických látok, kyselých, ktoré je na ňom uvedený. Po otvorení je trvanlivosť 12 mesiacov.

Príprava pasty
Pred odberom leštiacej pasty odstráňte originálnu pečať pod skrutkovacím uzáverom. Veko znovu naskrutkujte. Dobrotu postužujúce množstvo leštiacej pasty a naplňte do aplikátora. Následne aplikujte, napr. do krúžku LUNOS Propy. Dávaním následne alebo podobnej vhodnej leštiacej pasty. Pomocou vhodného leštiaceho nástroja naberte leštiacu pastu a začinite leštie pacienta. Pamätajte, prosím, na to, že samoredukujúca leštiaca pasta nastupí po cca 10 sekundách. Leštie tak úto, kým sa leštiaca časťce neobjaví. Aby sa po odstránení leštiacej pasty dostali všetky leštiace častice.

Kľúčovane a maximálna trvanlivosť
Po odobratí pasty túba ihneď opustiť zdravotní zariadenie, čím zabránite výskytu pasty. Skladujte v uzavretých, sterilných zabíjaniach, vyhýbajte sa vlhkosti a priamemu slnečnému žiareniu. Skladujte pri teplote od 0 °C do 25 °C. Nepodporuje výrobu kyselín, toxických látok, kyselých, ktoré je na ňom uvedený. Po otvorení je trvanlivosť 12 mesiacov.

Príprava pasty
Pred odberom leštiacej pasty odstráňte originálnu pečať pod skrutkovacím uzáverom. Veko znovu naskrutkujte. Dobrotu postužujúce množstvo leštiacej pasty a naplňte do aplikátora. Následne aplikujte, napr. do krúžku LUNOS Propy. Dávaním následne alebo podobnej vhodnej leštiacej pasty. Pomocou vhodného leštiaceho nástroja naberte leštiacu pastu a začinite leštie pacienta. Pamätajte, prosím, na to, že samoredukujúca leštiaca pasta nastupí po cca 10 sekundách. Leštie tak úto, kým sa leštiaca časťce neobjaví. Aby sa po odstránení leštiacej pasty dostali všetky leštiace častice.

Kľúčovane a maximálna trvanlivosť
Po odobratí pasty túba ihneď opustiť zdravotní zariadenie, čím zabránite výskytu pasty. Skladujte v uzavretých, sterilných zabíjaniach, vyhýbajte sa vlhkosti a priamemu slnečnému žiareniu. Skladujte pri teplote od 0 °C do 25 °C. Nepodporuje výrobu kyselín, toxických látok, kyselých, ktoré je na ňom uvedený. Po otvorení je trvanlivosť 12 mesiacov.

Príprava pasty
Pred odberom leštiacej pasty odstráňte originálnu pečať pod skrutkovacím uzáverom. Veko znovu naskrutkujte. Dobrotu postužujúce množstvo leštiacej pasty a naplňte do aplikátora. Následne aplikujte, napr. do krúžku LUNOS Propy. Dávaním následne alebo podobnej vhodnej leštiacej pasty. Pomocou vhodného leštiaceho nástroja naberte leštiacu pastu a začinite leštie pacienta. Pamätajte, prosím, na to, že samoredukujúca leštiaca pasta nastupí po cca 10 sekundách. Leštie tak úto, kým sa leštiaca časťce neobjaví. Aby sa po odstránení leštiacej pasty dostali všetky leštiace častice.

Kľúčovane a maximálna trvanlivosť
Po odobratí pasty túba ihneď opustiť zdravotní zariadenie, čím zabránite výskytu pasty. Skladujte v uzavretých, sterilných zabíjaniach, vyhýbajte sa vlhkosti a priamemu slnečnému žiareniu. Skladujte pri teplote od 0 °C do 25 °C. Nepodporuje výrobu kyselín, toxických látok, kyselých, ktoré je na ňom uvedený. Po otvorení je trvanlivosť 12 mesiacov.

Príprava pasty
Pred odberom leštiacej pasty odstráňte originálnu pečať pod skrutkovacím uzáverom. Veko znovu naskrutkujte. Dobrotu postužujúce množstvo leštiacej pasty a naplňte do aplikátora. Následne aplikujte, napr. do krúžku LUNOS Propy. Dávaním následne alebo podobnej vhodnej leštiacej pasty. Pomocou vhodného leštiaceho nástroja naberte leštiacu pastu a začinite leštie pacienta. Pamätajte, prosím, na to, že samoredukujúca leštiaca pasta nastupí po cca 10 sekundách. Leštie tak úto, kým sa leštiaca časťce neobjaví. Aby sa po odstránení leštiacej pasty dostali všetky leštiace častice.

Kľúčovane a maximálna trvanlivosť
Po odobratí pasty túba ihneď opustiť zdravotní zariadenie, čím zabránite výskytu pasty. Skladujte v uzavretých, sterilných zabíjaniach, vyhýbajte sa vlhkosti a priamemu slnečnému žiareniu. Skladujte pri teplote od 0 °C do 25 °C. Nepodporuje výrobu kyselín, toxických látok, kyselých, ktoré je na ňom uvedený. Po otvorení je trvanlivosť 12 mesiacov.

Príprava pasty
Pred odberom leštiacej pasty odstráňte originálnu pečať pod skrutkovacím uzáverom. Veko znovu naskrutkujte. Dobrotu postužujúce množstvo leštiacej pasty a naplňte do aplikátora. Následne aplikujte, napr. do krúžku LUNOS Propy. Dávaním následne alebo podobnej vhodnej leštiacej pasty. Pomocou vhodného leštiaceho nástroja naberte leštiacu pastu a začinite leštie pacienta. Pamätajte, prosím, na to, že samoredukujúca leštiaca pasta nastupí po cca 10 sekundách. Leštie tak úto, kým sa leštiaca časťce neobjaví. Aby sa po odstránení leštiacej pasty dostali všetky leštiace častice.

Kľúčovane a maximálna trvanlivosť
Po odobratí pasty túba ihneď opustiť zdravotní zariadenie, čím zabránite výskytu pasty. Skladujte v uzavretých, sterilných zabíjaniach, vyhýbajte sa vlhkosti a priamemu slnečnému žiareniu. Skladujte pri teplote od 0 °C do 25 °C. Nepodporuje výrobu kyselín, toxických látok, kyselých, ktoré je na ňom